

|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| *コクサッキーウイルス B4 型(NT) |      | 7062000   |
|                      |      | 担当部署  |
| COXB4(NT)            |      | 外注  |
| <b>検査オーダー</b>        |      |   |
| 患者同意に関する要求事項         |      | 特記事項なし  |
| オーダーリング手順            | 1    | 電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→感染症・ウイルス→コクサッキー→  |
|                      | 2    |   |
|                      | 3    |   |
|                      | 4    |   |
|                      | 5    |   |
| 検査に影響する臨床情報          |      | 該当なし  |
| 検査受付時間               |      | 8 : 15 ~ 16 : 00  |
| <b>検体採取・搬送・保存</b>    |      |   |
| 患者の事前準備事項            |      | 特記事項なし  |
| 検体採取の特別なタイミング        |      | 急性期（発病 2~7 日）と回復期（2~3 週）の検体を同時測定し、回復期の抗体価が急性期の結果の 4 倍（2 管差）以上に上昇したとき、血清学的に有意とみなします。 |
| 検体の種類                | 採取管名 | 内容物   |
| 1                    | 全血   | 10 青  |
| 2                    | -    | -   |
| 3                    | -    | -   |
| 4                    | -    | -   |
| 5                    | -    | -   |
| 6                    | -    | -   |
| 7                    | -    | -   |
| 8                    | -    | -   |
| 検体搬送条件               |      | 室温  |
| 検体受入不可基準             |      | 1)採取容器違いの検体<br>2)バーコードラベルの貼られていない検体<br>3)固形物  |
| 保管検体の保存期間            |      | 検査委託先で 2 週間   |
| <b>検査結果・報告</b>       |      |   |
| 検査室の所在地              |      | 株式会社 BML 総合研究所  |

|          |      |                       |      |      |      |
|----------|------|-----------------------|------|------|------|
|          |      | 350-1101 川越市的場 1361-1 |      |      |      |
| 測定時間     |      | 8～14日                 |      |      |      |
| 生物学的基準範囲 |      | 設定根拠については外注検査室に問合せ    |      |      |      |
| 臨床判断値    |      | 設定根拠については外注検査室に問合せ    |      |      |      |
| 基準値      |      |                       |      |      | T    |
| 共通低値     | 共通高値 | 男性低値                  | 男性高値 | 女性低値 | 女性高値 |
| 0        | 3    |                       |      |      |      |
| パニック値    | 高値   | 該当なし                  |      |      |      |
|          | 低値   | 該当なし                  |      |      |      |
| 生理的変動要因  |      | 該当なし                  |      |      |      |
| 臨床的意義    |      | 外注項目の為省略              |      |      |      |