

尿中乱用薬物				3990100	
				担当部署	
乱用薬物				一般	
検査オーダー					
患者同意に関する要求事項			特記事項なし		
オーダーリング手順	1	電子カルテ→指示①→検査→*3.緊急→			
	2				
	3				
	4				
	5				
検査に影響する臨床情報			特記事項なし		
検査受付時間			緊急対応（24 時間）		
検体採取・搬送・保存					
患者の事前準備事項			該当なし		
検体採取の特別なタイミング			特記事項なし		
検体の種類		採取管名	内容物	採取量	単位
1	新鮮尿	2 3 スピッツ	なし	10	mL
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
検体搬送条件			室温		
検体受入不可基準			1) 採取容器違いの検体 2) バーコードラベルの貼られていない検体 3) 量不足		
保管検体の保存期間			- 4 0℃凍結保存 3 か月程度		
検査結果・報告					
検査室の所在地			病院棟 3 階 中央検査部		

測定時間		30 分				
生物学的基準範囲		(-)				
臨床判断値		該当なし				
基準値					単位	なし
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値	
設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	
パニック値		高値	該当なし			
		低値	該当なし			
生理的変動要因		特記事項なし				
臨床的意義		尿中のアンフェタミン類(AMP)、バルビツール酸類(BAR)、ベンゾジアゼピン類(BZO)、コカイン系麻薬(COC)、大麻(THC)、メチレンジオキシメタンフェタミン類(MDMA)、モルヒネ系麻薬(OPI)、オキシコドン(OXY)、フェンシクリジン(PCP)、プロポキシフェン類(PPX)、三環系抗うつ剤(TCA)およびそれらの代謝産物の検出				