

|                   |    |                          |                                              |       |    |
|-------------------|----|--------------------------|----------------------------------------------|-------|----|
| *コルチゾール定量[蓄尿]     |    |                          |                                              | 70000 |    |
|                   |    |                          |                                              | 担当部署  |    |
| PU-Corti          |    |                          |                                              | 外注    |    |
| <b>検査オーダー</b>     |    |                          |                                              |       |    |
| 患者同意に関する要求事項      |    |                          | 特記事項なし                                       |       |    |
| オーダーリング手順         | 1  | 電子カルテ→指示①→検査→*5.尿・便・その他→ |                                              |       |    |
|                   | 2  |                          |                                              |       |    |
|                   | 3  |                          |                                              |       |    |
|                   | 4  |                          |                                              |       |    |
|                   | 5  |                          |                                              |       |    |
| 検査に影響する臨床情報       |    |                          | 特記事項なし                                       |       |    |
| 検査受付時間            |    |                          | 8 : 15～16 : 00                               |       |    |
| <b>検体採取・搬送・保存</b> |    |                          |                                              |       |    |
| 患者の事前準備事項         |    |                          | 特記事項なし                                       |       |    |
| 検体採取の特別なタイミング     |    |                          | 非抱合型コルチゾールを測定する。                             |       |    |
| 検体の種類             |    | 採取管名                     | 内容物                                          | 採取量   | 単位 |
| 1                 | 蓄尿 | 2 2 蓄尿                   | ユリメジャータブレット                                  | 10    | mL |
| 2                 | -  | -                        | -                                            | -     | -  |
| 3                 | -  | -                        | -                                            | -     | -  |
| 4                 | -  | -                        | -                                            | -     | -  |
| 5                 | -  | -                        | -                                            | -     | -  |
| 6                 | -  | -                        | -                                            | -     | -  |
| 7                 | -  | -                        | -                                            | -     | -  |
| 8                 | -  | -                        | -                                            | -     | -  |
| 検体搬送条件            |    |                          | 室温                                           |       |    |
| 検体受入不可基準          |    |                          | 1)採取容器違いの検体<br>2)バーコードラベルの貼られていない検体<br>3)固形物 |       |    |
| 保管検体の保存期間         |    |                          | 検査委託先で 2 週間                                  |       |    |
| <b>検査結果・報告</b>    |    |                          |                                              |       |    |
| 検査室の所在地           |    |                          | 株式会社 BML 総合研究所                               |       |    |

|          |      |                       |      |      |      |      |
|----------|------|-----------------------|------|------|------|------|
|          |      | 350-1101 川越市的場 1361-1 |      |      |      |      |
| 測定時間     |      | 2 ～ 3 日               |      |      |      |      |
| 生物学的基準範囲 |      | 設定根拠については外注検査室に問合せ    |      |      |      |      |
| 臨床判断値    |      | 設定根拠については外注検査室に問合せ    |      |      |      |      |
| 基準値      |      |                       |      |      | 単位   | μg/L |
| 共通低値     | 共通高値 | 男性低値                  | 男性高値 | 女性低値 | 女性高値 |      |
| 4.3      | 176  |                       |      |      |      |      |
| パニック値    |      | 高値                    | 該当なし |      |      |      |
|          |      | 低値                    | 該当なし |      |      |      |
| 生理的変動要因  |      | 特記事項なし                |      |      |      |      |
| 臨床的意義    |      | 外注項目の為省略              |      |      |      |      |