

| | | | | |
|-------------------|------|----------------------------|--------|--------|
| H 反射 | | S123 | | |
| H 反射 | | 担当部署 | | |
| H 反射 | | 生理 | | |
| 検査オーダー | | | | |
| 患者同意に関する要求事項 | | 該当なし | | |
| オーダーリング手順 | 1 | 電子カルテ→指示①→生理→神経伝導速度検査→H 反射 | | |
| | 2 | | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |
| | 5 | | | |
| 検査に影響する臨床情報 | | 該当なし | | |
| 検査受付時間 | | 8 : 45～17 : 30 | | |
| 検体採取・搬送・保存 | | | | |
| 患者の事前準備事項 | | 特記事項なし | | |
| 検体採取の特別なタイミング | | 特記事項なし | | |
| 検体の種類 | 採取管名 | 内容物 | 採取量 | 単位 |
| 1 | 人体 | 特記事項なし | 特記事項なし | 特記事項なし |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 検体搬送条件 | | ベッド不可 | | |
| 検体受入不可基準 | | 検査に同意を得られない患者 | | |
| 保管検体の保存期間 | | 特記事項なし | | |
| 検査結果・報告 | | | | |
| 検査室の所在地 | | 病院棟 3 階 中央検査部 | | |
| 測定時間 | | 各科による | | |

| | | | | | | |
|----------|--------|---|--------|--------|--------|--------|
| 生物学的基準範囲 | | 該当なし | | | | |
| 臨床判断値 | | 該当なし | | | | |
| 基準値 | | | | | 単位 | 特記事項なし |
| 共通低値 | 共通高値 | 男性低値 | 男性高値 | 女性低値 | 女性高値 | |
| 特記事項なし | 特記事項なし | 特記事項なし | 特記事項なし | 特記事項なし | 特記事項なし | |
| パニック値 | 高値 | 該当なし | | | | |
| | 低値 | 該当なし | | | | |
| 生理的変動要因 | | 該当なし | | | | |
| 臨床的意義 | | H 反射は、末梢神経を電気刺激した時にみられる脊髄反射で、その刺激した神経支配下の筋に反射応答が生じたものをいう。痙性麻痺など、脊髄前角細胞の興奮に関連している。 | | | | |