

単線維筋電図		S137		
単線維筋電図		担当部署		
<b>検査オーダー</b>				
患者同意に関する要求事項		同意書あり		
オーダリング手順	1	電子カルテ→指示①→生理→筋電図検査→単線維筋電図(各科で実施)		
	2			
	3			
	4			
	5			
検査に影響する臨床情報		該当なし		
検査受付時間		8:45~17:30		
<b>検体採取・搬送・保存</b>				
患者の事前準備事項		特記事項なし		
検体採取の特別なタイミング		特記事項なし		
検体の種類	採取管名	内容物	採取量	単位
1 人体	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
検体搬送条件		ベッド不可		
検体受入不可基準		検査に同意を得られない患者		
保管検体の保存期間		特記事項なし		
<b>検査結果・報告</b>				
検査室の所在地		病院棟 3 階 中央検査部		
測定時間		各科による		

生物学的基準範囲		該当なし			
臨床判断値		該当なし			
基準値				単位	特記事項なし
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値
特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし
パニック値	高値	該当なし			
	低値	該当なし			
生理的変動要因		該当なし			
臨床的意義		筋電図検査は電極を用いて捉えた活動電位を図として表現したもので、筋電図検査の中でも特に電極部分が極めて小さく単一筋線維から発生する活動電位を分離することが可能となり、神経筋疾患の運動単位の機能、特に神経筋伝達機能をみるのに最も鋭敏な検査法である。			