

【食道癌】	【胃癌】	【肺癌】	【大腸癌】	【肺癌】	【乳癌】	【腎癌】	【副腎腫瘍】	【膀胱癌】	【婦人科癌（子宮体癌、子宮頸癌、卵巣癌）】
年齢	年齢	性別	性別	性別	性別	性別	臨床情報	性別	性別
性別	性別	年齢	年齢	年齢	年齢	人種	性別	人種	年齢
人種	人種	人種	人種	身長	身長	身長	年齢	身長	身長
身長	身長	身長	身長	体重	体重	体重	身長	体重	体重
体重	体重	体重	体重	人種	BMI	ウイルス検査結果	体重	ウイルス検査結果	BMI
BMI	BMI	BMI	BMI	病名	人種	HBs抗原	人種	HBs抗原	人種
飲酒歴	病名（初診時）	病名（術前）	病名（術前）	術前併存症	主訴	HCV	ウイルス検査結果	HCV	初経
喫煙歴	ヘリコバクターピロリ抗体判定	併存疾患	併存疾患	PS	病名	HIV-1/2抗体	HBs抗原	HIV-1/2抗体	閉経
1日あたりの本数	ピロリ菌感染	その他の疾患の場合	心疾患	呼吸機能_VC(ml)	術前併存症	HTLV-1	HCV	HTLV-1	妊娠
年数	ウイルス検査結果	併存疾患：詳細	COPD	呼吸機能_FVC(ml)	既往歴	腫瘍患側	HIV-1/2抗体	腫瘍の形態	分娩
BI	HBs抗原	家族歴	HT	呼吸機能_FEV1(ml)	家族歴（乳癌）	腫瘍径(mm)	HTLV-1	乳頭状の場合	家族歴（婦人科癌）
病名（初診時）	HCV	飲酒歴	DM	呼吸機能_DLCO'(ml/min/mmHg)	家族歴（乳癌以外）	cT分類	腫瘍患側	結節状の場合	家族歴（婦人科癌以外）
食道胃接合部癌の場合	HIV-1/2	喫煙歴	その他疾患	喫煙指数(Smoking index)	出産歴	cN分類	腫瘍径(mm)	腫瘍径(mm)	飲酒歴
先行ESD	HTLV-1/2	ウイルス検査結果	家族歴	ウイルス検査結果	授乳	cM分類	術前診断	cT分類	喫煙歴
併存疾患	併存疾患	HBs抗原	飲酒歴	HBs抗原	不妊治療の有無	手術情報	手術術式	cN分類	病名（初診時）
心疾患	心疾患	HCV	喫煙歴	HCV抗体	月経開始年齢	病名	手術術式	cM分類	術前併存症
COPD	COPD	HIV-1/2	ウイルス検査結果	HIV-1/2	閉経	手術術式	手術アプローチ	手術情報	既往歴
HT	HT	HTLV-1/2	HBs抗原	HTLV-1/2	月経終了年齢	手術アプローチ	その他特記事項	病名	ウイルス検査結果
DM	DM	術前情報	HBs抗体	術前CEA	閉経原因	病理所見	病理所見	手術術式	HBs抗原
その他疾患	その他疾患	CEA（初診時）	HCV抗体	術前CYFRA（サイトケラチン19フラグメント）	飲酒	組織型	術後病理診断	病理所見	HCV抗体
ウイルス検査結果	食道胃接合部癌の場合	CA19-9（初診時）	HIV-1/2抗体	術前proGRP	喫煙	悪性腫瘍	皮質腫瘍の場合	組織型	HIV-1/2
HBs抗原	Siewert分類	CA125（初診時）	HBc抗体	術前KL-6（シアル化糖鎖抗原KL-6）	喫煙指数(Smoking index)	良性腫瘍	髄質腫瘍	異形型（WHO/ISUP分類）	HTLV-1/2
HCV	食道浸潤長(cm)	DUPAN2（初診時）	HTLV-1/2抗体	術前導入療法	BRCA1	異形型（WHO/ISUP分類）	転移性副腎腫瘍	肉腫様変化	検査データ
HIV-1/2	残胃癌の場合	術前減黄のありなし	検査データ	治療効果判定（RECIST）	BRCA2	肉腫様変化	その他	ラブドイド変化	術前CEA
HTLV-1/2	前回手術	術前補助化学療法	検査データ	術後病理診断名	ウイルス検査結果	ラブドイド変化	転帰	壊死	術前CA125
検査データ	病態および手術情報	コース数	CA19-9	転移性肺腫瘍：転移元	HBs抗原	壊死	再発	脈管侵襲（該当するものすべてを選択）	術前CA19-9
初診時	占拠部位	RECIST分類	腫瘍情報	転移性肺腫瘍：切除個数	HCV抗体	脈管侵襲	生存もしくは死亡	診断関連特異的マーカー	術前SCC
SCC	肉眼型	占拠部位	前治療のありなし	縦隔腫瘍：種類	HIV-1/2	診断関連特異的マーカー		遺伝子変異	術前細胞診・組織診
CYFRA	組織型	病巣の数	前治療	縦隔腫瘍：その他詳細	HTLV-1/2	遺伝子変異		切除断端	子宮腔部（LBC）
抗p53抗体	cT	TS	前治療での薬剤応答性	術式	術前検査情報	腫瘍の広がり		pT分類	子宮腔部
CEA	T4b臓器	肉眼的分類	原発腫瘍臓器名	リンパ節郭清度	MMG所見	切除断端		pN分類	子宮頸部
CA19-9	cN	組織型	原発、転移、再発	合併切除	MMGカテゴリー：右	pT分類		pM分類	子宮内膜（LBC）
術前治療後	cM	切除可能性分類	取得試料の臓器名	形成有無	左	pN分類		転帰（1年後を目安に記載する）	子宮内膜
SCC	cStage（TNM 8th edition）	手術所見	病理組織学的診断	手術時間（min）	US所見	pM分類		再発	術前化学療法
CYFRA	CEA	アプローチ	cT	出血量（mL）	USカテゴリー	転帰（1年後を目安に記載する）		再発ありの場合の治療法	レジメン
抗p53抗体	CA125	術式	cN	術中輸血	MRI所見	アジュバント療法の有無		生存	コース等
CEA	CA19-9	郭清範囲	cM	アプローチ	CT所見	再発			術前効果判定
CA19-9	術前化学療法	手術時間：	cStage	開胸コンバート	PET所見	再発ありの場合の治療法			手術情報
腫瘍位置	レジメン	出血量：	sT	主たる切除部位	生検結果				手術時間（min）
最大径	コース数	輸液量	sN	肺切除部位	腫瘍部位				出血量
肉眼型	Conversionの有無	合併切除臓器1	sM	肺切除範囲	組織型				アプローチ
組織型	手術時間	合併切除臓器2	sStage	区域切除詳細	ER				術式
cT	出血量	sT	手術情報	同時多発	PgR				病理結果
cN	アプローチ	sN	アプローチ：	根治度	MIB-1 index				迅速標本
cM	術式	sM	術式	開胸時洗浄細胞診	NG 核グレード				腹腔洗浄液
cStage（TNM 8th edition）	郭清範囲	sStage	リンパ節郭清	肺尖部胸壁浸潤	HG 組織学的グレード				腹水
T4因子	再建法	CH	Stage	cT	HER2				組織型
術前化学療法	合併切除臓器1	DU	肉眼的分類	cN	HER2(FISH)				漿液性癌の場合
レジメン	合併切除臓器2	S	fT	cM	PD-L1(sp142)				SIL/CINの場合
コース数	病理結果等	RP	fN	c-stage	PD-L1（22C3）				SCCの場合
術前放射線治療	占拠部位	PV	fM	病理結果	cT				AISの場合
手術時間	占拠部位断面	A	H	組織型	cN				Adenoの場合
出血量	肉眼型	PL	P	組織型詳細	cM				その他の場合
術式	最大腫瘍径(mm)	OO	PUL	腫瘍径（mm）	c-stage				G
郭清範囲	組織型	PCM	fStage	浸潤径（mm）	転移部位				pT
再建臓器	pT	BCM	INF	G	術前化学療法				pN
再建経路	T4b臓器	DPM	Ly	grade	PSTレジメン				pM
胃管径	INF	R	v	pl	PST術前効果判定				LVI

吻合法	Ly
吻合部位	V
合併切除臓器1	病理学的効果判定
合併切除臓器2	pPM
Conversionの有無	pDM
病理結果等	根治度
腫瘍径(mm)	H
腫瘍位置	P
肉眼型	CY
組織型	pN
pT	リンパ節転移個数
pN	リンパ節郭清個数
pM	pM
pStage	pStage
リンパ節転移個数	HER2
リンパ節郭清個数	PD-L1
INF	補助療法の有無
Ly	レジメン
V	コース数など
pPM	再発のありなし
pDM	再発部位
pRM	生存のありなし
病理学的効果判定	死因
根治度	
HER2	
詳細	
PD-L1	
CPS:	
補助化学療法の有無	
レジメン	
コース数など	
再発の有無	
生存の有無	
死因	

P
H
CY
病理結果
占拠部位
病巣の数
TS
肉眼的分類
組織型
pT
間質量
INF
ly
v
ne
mpd
pCH
pDU
pS
pRP
pPV
pA
pPL
pOO
pPCM
pBCM
pDPM
R
pN
pN詳細
pM
M1を選択した場合
pStage
病理学的治療効果判定 Grade
遺伝子情報
UGT1A1
KRAS
変異ありの場合
NRAS
変異ありの場合
GNAS
変異ありの場合
BRAF V600
術後補助化学療法
術後補助化学療法のありなし
術後補助化学療法の結果
再発のありなし
再発部位
再発後、化学療法のありなし
生死の別
死因

BD
Pn
PM
DM
RM
R
Cur
遺伝子変異/発現状況
KRAS
NRAS
BRAF
MSI
HER2
長期予後
転帰
死因

Ly
v
pm
br
pT
病理学的治療効果判定
Ef.2以上のとき
RVT
pN
pN詳細
pM
pM詳細
p-stage
PD-L1
BRAF
EGFR
非浸潤癌の場合
浸潤癌の場合
浸潤性乳管癌
特殊型の場合
組織型詳細
組織学的波及度
Ly
v
NG 核グレード
HG 組織学的グレード
margin
PST術後効果判定
pT
pN
pM
術後ステージ

術後治療情報

OncotypeDx施行の有無
RS
術後内分泌療法
術後化学療法
術後分子標的療法
術後放射線療法
RT施行施設
RT線量
RT回数

転移再発情報

発見契機
部位
治療方法
内分泌療法
化学療法
分子標的療法

合併症情報

初期検査時合併症
周術期合併症
周術期合併症詳細:
放射線治療による合併症
薬物合併症
薬物合併症詳細:
転帰
死因
パネル検査

手術情報等

術式
リンパ節切除範囲
再建方法
出血量
手術時間(min)
SNB個数
SNB
SNBコピー数
Ax転移個数
切除断端
切除断端コメント

病理結果

浸潤径(mm)
組織型
非浸潤癌の場合
浸潤癌の場合
浸潤性乳管癌
特殊型の場合

組織型詳細
組織学的波及度

Ly
v
NG 核グレード
HG 組織学的グレード
margin
PST術後効果判定

pT
pN
pM
術後ステージ

術後治療情報

OncotypeDx施行の有無
RS
術後内分泌療法
術後化学療法
術後分子標的療法
術後放射線療法
RT施行施設
RT線量
RT回数

転移再発情報

発見契機
部位
治療方法
内分泌療法
化学療法
分子標的療法

合併症情報

初期検査時合併症
周術期合併症
周術期合併症詳細:
放射線治療による合併症
薬物合併症
薬物合併症詳細:
転帰
死因
パネル検査

ly
v
margin
術後効果判定
リンパ節転移個数
リンパ節郭清個数
転移部位

進行期分類

病名
Stage
術後再発リスク分類

術後補助療法

転移再発情報

部位
遺伝子検査
長期予後
転帰
死因

【体腔液のみ提出の場合】

病名
組織型
類内膜癌の場合
漿液性癌の場合
SIL/CINの場合
SCCの場合
AISの場合
Adenoの場合

Stage

術前化学療法

レジメン

コース等

手術情報

術式

術後化学療法

放射線療法

検査データ

CEA
CA125
CA19-9
SCC

ウイルス検査結果

HBs抗原
HCV抗体
HIV-1/2
HTLV-1/2

病理結果

腹腔洗浄液
腹水
G
pT
pN
pM
LVI
Ly
V
margin
術後効果判定
リンパ節転移個数

リンパ節郭清個数

転移部位

術後再発リスク分類

遺伝子検査

BRCA1

BRCA2

HRD

転移再発情報

部位

長期予後

転帰

死因

【心筋疾患】	【炎症性筋疾患】	【神経変性疾患】	【糸球体疾患】
性別	性別	性別	性別
年齢	年齢	年齢	年齢
身長	身長	身長	身長
体重	体重	体重	体重
BMI	人種	人種	人種
人種	病名(入院時)	病名	病名(入院時)
病名(初診時)	併存症	併存症	併存症
併存疾患	DM	DM	ありの場合
既往症	HT	HT	その他の併存症の場合
家族歴(心疾患)	脂質異常症	中枢神経系血管障害	併存症詳細:
家族歴(心疾患以外)	その他の併存症	中枢神経系外傷	既往症
飲酒歴	既往症	脊柱管狭窄症	家族歴(腎疾患・透析)
喫煙歴	心機能	その他の併存症	家族歴(腎疾患以外)
ウイルス検査結果	心電図異常	既往症	生活歴
HBs抗原	心エコー	家族歴	喫煙歴有無
HCV抗体	EF	両親の血族婚	飲酒歴有無
HIV-1/2抗体	呼吸機能	臨床データ	血圧(検体採取日)
HTLV-1	%VC	FAB	ウイルス検査結果
検査データ	%FVC	MMSE	HBs抗原
Hb	FEV1.0%	HDS-R	HCV抗体
クレアチニン	スタチン内服歴	MoCA-J	HIV-1/2
eGFR	家族歴	HBs抗原	HTLV-1/2
NT-proBNP	家族歴(神経筋疾患以外)	HBs抗体	尿検査
心筋トロポニンT	両親の血族婚	HCV	P
ヒト脳性Na利尿ペプチド*	生活歴	HIV-1/2	OB
遊離L鎖κ/λ比	喫煙歴	HTLV-1/2	P/Cr
κ鎖	飲酒歴	髄液	RBC
λ鎖	採取部位	蛋白	赤血球形態
内服	HBs抗原	糖	尿中β2MG
臨床所見	HCV抗体	IgG	尿中NAG
臨床診断	HIV-1/2抗体	多形核球	蓄尿蛋白量
採取部位	HTLV-1	単核球	NGAL
エコー所見	血液所見	細胞数	顆粒円柱
心筋壁の厚さ	CK	オリゴクローナルバンド	脂肪円柱
左室	乳酸	ミエリン塩基性蛋白	卵円形脂肪体
右室	ビルビン酸	sIL-2R	血液検査
中隔	KL-6	ACE	Cr
心筋壁の運動	CRP	同時血糖(mg/dl)	eGFR
LVEF	アルドラーゼ	遺伝子異常の有無	BUN
左心室の径	ミオグロビン	遺伝子異常	TP
収縮期	抗核抗体(FA法)	臨床診断名	Alb
拡張期	抗Sm抗体(FEIA)	病名(ICD-10準拠)	T-chol
その他	抗Sm抗体	確立診断名	LDL-C
冠動脈所見	抗SS-A抗体(FEIA)		TG
狭窄	抗SS-A抗体		CRP
病理診断	抗SS-B抗体(FEIA)		IgG
光顕および電顕所見	抗SS-B抗体		IgA
心アミロイドーシスの場合	抗Jo-1抗体(FEIA)		IgM
アミロイド染色(DFS)	抗Jo-1抗体		C3
コンゴーレッド染色	抗Scl-70抗体(FEIA)		C4
病型	抗Scl-70抗体		CH50
診断名	抗ARS抗体判定		ASO
	抗ARS抗体インデックス		リウマチ因子
	抗MDA5抗体		抗核抗体
	抗MDA5抗体(インデックス値)		HbA1c
	抗TiF-1γ抗体		WBC
	抗TiF-1γ抗体(インデックス値)		Hb
	抗Mi-2抗体		Ht

抗Mi-2抗体（インデックス値）
抗ds-DNA抗体
抗ds-DNA抗体IgG（FEIA）
抗ミトコンドリアM2 抗体
抗RNP抗体（FEIA）
抗U-1-RNP抗体
その他自己抗体
Mi-2
Ku
PM-Scl100
PM-Scl75
SRP
Jo-1
PL-7
PL-12
OJ
EJ
Ro-52
抗SRP抗体
抗HMGCR抗体
遺伝子異常の有無
病理診断
NCNP筋病理所見
診断名（ICD-10準拠）
 その他の場合
確立診断名
治療歴
（治療開始から6カ月）
治療法
 治療詳細
 治療開始4週後のCK値

PLT
MPO- ANCA抗体
MPO- ANCA抗体価
PR3-ANCA抗体
PR3-ANCA抗体価
抗GBM抗体
抗GBM抗体価
IgE
好酸球比率
腎組織種類
採取部位
病理診断
蛍光免疫染色
IgG
IgA
IgM
C3c
C1q
Fib
病名（ICD-10）
治療歴
ステロイドパルス療法の有無
 ありの場合
 尿検査
 30日後 P/Cr
 90日後 P/Cr
PSL
CyA
IVCY
MZR
RTX
Tac
MMF
血漿交換法
IgA腎症の場合
両側口蓋扁桃摘出術の有無
ステロイドパルス療法の有無
ステロイドパルス療法の回数
治療終了後の検査結果
 P
 OB
 P/Cr
 RBC
転帰
死因