【食道癌】
年齢
性別
人種
身長
体重
BMI
飲酒歴
喫煙歴
病名（初診時）
先行ESDの有無
併存疾患
ウイルス検査結果
HBs抗原
HCV
HIV−1/2
HTLV−1/2
初診時
SCC
CYFRA
抗p53抗体
CEA
CA19−9
術前治療後
SCC
CYFRA
抗p53抗体
CEA
CA19−9
手術情報等
腫瘍位置
最大径
肉眼型
組織型
cT
cN
cM
cStage (TNM 8th edition)
術前化学療法
レジメン
コース数
術前放射線治療
手術時間
出血量
術式
郭清範囲
再建臓器
再建経路
胃管径
吻合法
吻合部位
合併切除臓器
Conversionの有無
合併症（CDⅡ以上）
縫合不全
肺炎
反回神経麻痺
吻合部狭窄
病理結果等
腫瘍径(mm)
腫瘍位置
肉眼型
組織型
pT
pN
pM
pStage
リンパ節転移個数
リンパ節郭清個数
INF
Ly
V
pPM
pDM
pRM
病理学的効果判定
根治度
HER2
PD−L1
CLDN18.2
MMR
補助化学療法
レジメン
コース数など
長期予後
再発の有無
再発部位
生存の有無
死因

【胃癌】
年齢
性別
人種
身長
体重
BMI
病名
併存疾患
ヘリコバクターピロリ抗体判定
ピロリ菌感染
ウイルス検査結果
HBs抗原
HCV
HIV−1/2
HTLV−1/2
病態および手術情報
占拠部位
肉眼型
組織型
cT
T4b臓器
cN
cM
cStage (TNM 8th edition)
CEA
CA125
CA19−9
術前化学療法
レジメン
コース数
Conversionの有無
手術時間
出血量
アプローチ
術式
郭清範囲
再建法
合併切除臓器
合併症
縫合不全
肺炎
膵液瘻
病理結果等
占拠部位
占拠部位断面
肉眼型
最大腫瘍径(mm)
組織型
pT
T4b臓器
INF
Ly
V
pPM
pDM
病理学的効果判定
根治度
H
P
CY
pN
リンパ節転移個数
リンパ節郭清個数
pM
pStage
HER2
PD−L1
CLDN18.2
MMR
補助療法
長期予後
再発のありなし
再発部位
生存のありなし
死因

【膵癌】
性別
年齢
人種
身長
体重
BMI
病名（術前）
併存疾患
家族歴
飲酒歴
喫煙歴
入院日数
ウイルス検査結果
HBs抗原
HCV
HIV−1/2
HTLV−1/2
術前情報
CEA（初診時）
CA19−9（初診時）
CA125（初診時）
DUPAN2（初診時）
術前減黄のありなし
術前補助化学療法
RECIST分類
占拠部位
病巣の数
TS
肉眼的分類
組織型
切除可能性分類
手術所見
アプローチ
術式
郭清範囲
合併切除臓器
sT
sN
sM
sStage
CH
DU
S
RP
PV
A
PL
OO
PCM
BCM
DPM
R
P
H
CY
合併症（CDⅢ以上）
膵液瘻
DGE
胆汁瘻
病理結果
占拠部位
病巣の数
TS
肉眼的分類
組織型
pT
間質量
INF
ly
v
ne
mpd
pCH
pDU
pS
pRP
pPV
pA
pPL
pOO
pPCM
pBCM
pDPM
R
pN
pM
pStage
病理学的治療効果判定 Grade
遺伝子情報
UGT1A1
KRAS
NRAS
GNAS
BRAF V600
術後補助化学療法
術後補助化学療法のありなし
再発のありなし
再発部位
再発後、化学療法のありなし
長期予後
生死の別
死因

【肝細胞癌】
性別
年齢
人種
身長
体重
BMI
病名（術前）
併存疾患
肝切除の既往
飲酒歴
喫煙歴
ウイルス検査結果
HBe抗原
HBe抗体
HCV抗体
HBs抗原
HBc抗体
HBV−DNA
HCV−RNA
HIV−1/2
HTLV−1/2
術前情報
CEA（初診時）
AFP（初診時）
AFP−L3%(初診時)
CA19−9（初診時）
PIVKA−Ⅱ（初診時）
T−Bil
D−Bil
ALB
PT
PT(ratio)
ICG15
K値（ICGクリアランス）
ALBI Score
Child Pugh Score
Liver damage
術前治療の有無
手術所見
アプローチ
術式
合併切除臓器
手術時間
出血量
輸液量
輸血
Total Pringlle時間
摘出肝重量
合併症（CDⅢ以上）
胆汁瘻
病理結果
分化度
組織型
腫瘍個数
腫瘍径
肝内転移
発育様式
皮膜形成
皮膜浸潤
隔壁形成
漿膜浸潤
リンパ節転移
血管侵襲
胆管侵襲
切除断端の浸潤
非癌部の所見
脂肪化の程度
線維化の程度
炎症の程度
胆管侵襲
腹膜播種性転移
pT
pN
pM
pStage
術後補助療法
長期予後（登録後5年）
再発のありなし
再発部位
生死の別
死因

【大腸癌】
性別
年齢
人種
身長
体重
BMI
病名（術前）
併存疾患
家族歴
飲酒歴
喫煙歴
ウイルス検査結果
HBs抗原
HBs抗体
HCV抗体
HIV−1/2抗体
HBc抗体
HTLV−1/2抗体
検査データ
CEA
CA19−9
腫瘍情報
前治療のありなし
前治療での薬剤応答性
原発腫瘍臓器名
原発、転移、再発
病理組織学的診断
cT
cN
cM
cStage
sT
sN
sM
sStage
手術情報
アプローチ：
術式
リンパ節郭清
Stage
肉眼的分類
fT
fN
fM
H
P
PUL
fStage
INF
Ly
v
BD
Pn
PM
DM
RM
R
Cur
遺伝子変異/発現状況
KRAS
NRAS
BRAF
MSI
HER2
長期予後
転帰
死因

【肺癌】
性別
年齢
身長
体重
人種
病名
併存症
喫煙指数（Smoking index）
病変径
充実成分径
cT
cN
cM
c−stage
細胞診
組織診
リンパ節
PD−L1（22C3）
BRAF
EGFR
ALK
ROS−1
RET
MET
NTRK
KRAS
ERBB2
周術期情報
手術時の年齢
手術時の身長
手術時の体重
PS
術前診断
術後診断
術式
リンパ節郭清度
合併切除
形成有無
術前導入療法
化学療法を選択した場合
治療効果判定（RECIST）
迅速組織診
根治度
開胸時洗浄細胞診
肺尖部胸壁浸潤
術前CEA
術前CYFRA
術前proGRP
術前KL−6
術前NSE
VC（ml）
FVC（ml）
FEV1（ml）
DLCO'（ml/min/mmHg）
手術時間（min）
出血量（mL）
輸血
経過：
退院時転帰
術後30日以内の合併症
術後30日転帰
術後90日転帰
術後病理診断
組織型
腫瘍径（mm）
浸潤径（mm）
G
STAS
pm
pl
Ly
v
br
R
病理学的治療効果判定
RVT
Ef.2以上のとき
pT
pN
pM
p−stage
術後補助療法
長期予後
再発の有無
生死

【乳癌】
性別
年齢
身長
体重
BMI
人種
主訴
自己発見の場合
検診の場合
病名
術前併存症
既往歴
家族歴（乳癌）
家族歴（乳癌以外）
月経開始年齢
閉経
月経終了年齢
閉経原因
出産歴
授乳
飲酒
喫煙
喫煙指数（Smoking index）
ウイルス検査結果
HBs抗原
HCV抗体
HIV−1/2
HTLV−1/2
術前検査等
CEA
CA15−3
1CTP
MMG所見
MMGカテゴリー
US所見
USカテゴリー
MRI所見
CT所見
PET所見
生検結果
腫瘍部位
組織型
NG 核グレード
HG 組織学的グレード
ER
PgR
MIB−1 index
HER2
HER2(FISH)
PD−L1(sp142)
PD−L1（22C3）
サブタイプ
cT
cN
cM
c−stage
転移部位
術前化学療法
治療後の所見
MMG
US
MRI
CT
治療効果判定
治療後Stage
ycT
ycN
ycM
yStage
手術所見等
術式
リンパ節切除範囲
再建方法
出血量
手術時間（min）
SNB個数
術中迅速結果
切除断端
病理結果等
浸潤径（㎜）
組織型
組織学的波及度
Ly
v
NG 核グレード
HG 組織学的グレード
margin
PST術後効果判定
pT
pN
Ax転移個数
pStage
術後治療等
周術期合併症
OncotypeDx施行の有無
術後内分泌療法
術後化学療法
術後分子標的療法
術後放射線療法
RT線量
RT回数
転移再発情報
発見契機
部位
治療方法
転帰
死因

【腎癌】
性別
人種
身長
体重
ウイルス検査結果
HBs抗原
HCV
HIV−1/2抗体
HTLV−1
腫瘍患側
腫瘍径(mm)
cT分類
cN分類
cM分類
手術情報
病名
手術術式
手術アプローチ
病理所見
組織型
異型度（WHO/ISUP分類）
肉腫様変化
ラブドイド変化
壊死
脈管侵襲
腫瘍の広がり
切除断端
pT分類
pN分類
pM分類
転帰
アジュバント療法の有無
再発の有無確認
再発ありの場合の治療法
生存および死亡の確認

【副腎腫瘍】
性別
年齢
身長
体重
人種
ウイルス検査結果
HBs抗原
HCV
HIV−1/2抗体
HTLV−1
腫瘍患側
腫瘍径(mm)
術前診断
手術情報
手術術式
手術アプローチ
病理所見
術後病理診断
転帰
再発の有無確認
生存および死亡の確認

【膀胱癌】
性別
生年月日
人種
身長
体重
ウイルス検査結果
HBs抗原
HCV
HIV−1/2抗体
HTLV−1
腫瘍の形態
腫瘍径(mm)
cT分類
cN分類
cM分類
手術情報
病名
手術術式
病理所見
組織型
異型度:
脈管侵襲:
INF:
pT分類
pN分類
pM分類
転帰
再発の有無
再発ありの場合の治療法
生存および死亡の確認

【子宮体癌 】
年齢
身長
体重
BMI
人種
初経
閉経
妊娠
分娩
家族歴（婦人科癌）
家族歴（婦人科癌以外）
飲酒歴
喫煙歴
病名
併存症
既往歴
術前検査
CEA
CA125
CA19−9
SCC
ウイルス検査結果
HBs抗原
HCV抗体
HIV−1/2
HTLV−1/2
細胞診・組織診
子宮腟部（LBC）
子宮腟部
子宮内膜（LBC）
子宮内膜
手術所見
手術時の年齢
手術時間（min）
出血量
術式
迅速標本
病理結果等
組織型
Grade
LVI
ly
v
margin
術後効果判定
腹腔洗浄液
腹水
pT
pN
pM
リンパ節転移個数
リンパ節郭清個数
進行期分類
Stage
術後再発リスク分類
補助療法
放射線療法
転移再発情報
部位
転帰
死因

【子宮頸癌 】
年齢
身長
体重
BMI
人種
初経
閉経
妊娠
分娩
家族歴（婦人科癌）
家族歴（婦人科癌以外）
飲酒歴
喫煙歴
病名
併存症
既往歴
術前検査
CEA
CA125
CA19−9
SCC
ウイルス検査結果
HBs抗原
HCV抗体
HIV−1/2
HTLV−1/2
細胞診・組織診
子宮腟部（LBC）
子宮腟部
子宮頸部
子宮内膜（LBC）
子宮内膜
手術所見
手術時の年齢
手術時間（min）
出血量
術式
迅速標本
病理結果等
組織型
Grade
LVI
ly
v
margin
術後効果判定
腹腔洗浄液
腹水
pT
pN
pM
リンパ節転移個数
リンパ節郭清個数
進行期分類
Stage
術後再発リスク分類
補助療法
放射線療法
転移再発情報
部位
転帰
死因

【卵巣癌 】
年齢
身長
体重
BMI
人種
初経
閉経
妊娠
分娩
家族歴（婦人科癌）
家族歴（婦人科癌以外）
飲酒歴
喫煙歴
病名
併存症
既往歴
術前検査
CEA
CA125
CA19−9
SCC
ウイルス検査結果
HBs抗原
HCV抗体
HIV−1/2
HTLV−1/2
細胞診・組織診
子宮腟部（LBC）
子宮腟部
子宮内膜（LBC）
子宮内膜
手術所見
手術時の年齢
手術時間（min）
出血量
術式
迅速標本
病理結果等
組織型
Grade
LVI
ly
v
margin
術後効果判定
腹腔洗浄液
腹水
pT
pN
pM
リンパ節転移個数
リンパ節郭清個数
進行期分類
Stage
術後再発リスク分類
補助療法
放射線療法
転移再発情報
部位
転帰
死因

【造血器腫瘍】
性別
年齢
身長
体重
BMI
人種
病名
造血器前駆病変
併存疾患
既往症
家族歴（造血器疾患）
家族歴（造血器疾患以外）
飲酒歴
喫煙歴
ウイルス検査結果
HBs抗原
HBs抗体
HBc抗体
HCV抗体
HIV−1/2抗体
HTLV−1
検査データ
WBC
RBC
Hb
Ht
PLT
APTT
PT
PT(ratio)
PT INR
フィブリノーゲン
D.Dダイマー
FDP
アンチトロンビン
AST（GOT）
ALT（GPT）
LD_IFCC
Cr
UA
BUN
IgG
IgA
IgM
可溶性インターロイキン−2
WT 1 mRNA定量
血液像
骨髄像
特殊染色
ペルオキシダーゼ[骨髄]
エステラーゼ染色[骨髄]
PAS
鉄
ACP染色
白血病ｷﾒﾗSC(BM)
*MAJ BCR−ABL1
*MIN BCR−ABL1
*PML RARA
*RUNX1−RUNX1T1
*CBFB−MYH11
*DEK−NUP214
*NUP98−HOXA9
*ETV6−RUNX1
*STIL−TAL1
*KMT2A−AFF1
*KMT2A−AFDN
*KMT2A−MLLT3
*KMT2A−MLLT1
*TCF3−PBX1
病理結果
確定診断
転帰
死因

【心筋疾患】
性別
年齢
身長
体重
BMI
人種
病名（初診時）
併存疾患
既往症
家族歴（心疾患）
家族歴（心疾患以外）
飲酒歴
喫煙歴
ウイルス検査結果
HBs抗原
HCV抗体
HIV−1/2抗体
HTLV−1
検査データ
Hb
クレアチニン
eGFR
NT−proBNP
心筋トロポニンT
ヒト脳性Na利尿ペプチド
遊離L鎖 κ/λ比
κ鎖
λ鎖
内服
臨床所見
臨床診断
採取部位
エコー所見
心筋壁の厚さ
左室
右室
中隔
心筋壁の運動
LVEF
左心室の径
収縮期
拡張期
冠動脈狭窄の有無
病理診断
診断名

【神経変性疾患】
性別
年齢
身長
体重
人種
病名
併存症
既往症
家族歴
家族歴（神経筋疾患以外）
両親の血族婚
臨床データ
FAB
MMSE
HDS−R
MoCA−J
ウイルス検査結果
HBs抗原
HBs抗体
HCV
HIV−1/2
HTLV−1/2
ラボデータ
髄液
同時血糖（mg/dl）
遺伝子異常の有無
確立診断名
免疫疾患の場合
治療歴

【炎症性筋疾患】
性別
年齢
身長
体重
人種
病名（入院時）
併存症
既往症
心機能
呼吸機能
スタチン内服歴
家族歴
家族歴（神経筋疾患以外）
両親の血族婚
喫煙歴
飲酒歴
採取部位
ウイルス検査結果
HBs抗原
HCV抗体
HIV−1/2抗体
HTLV−1
臨床データ
血液所見
CK
乳酸
ピルビン酸
KL−6
CRP
アルドラーゼ
ミオグロビン
抗核抗体（FA法）
抗Sm抗体（FEIA）
抗Sm抗体
抗SS−A抗体（FEIA）
抗SS−A抗体
抗SS−B抗体（FEIA）
抗SS−B抗体
抗Jo−1抗体（FEIA）
抗Jo−1抗体
抗Scl−70抗体（FEIA）
抗Scl−70抗体
抗ARS抗体判定
抗ARS抗体インデックス
抗MDA5抗体
抗MDA5抗体（インデックス値）
抗TiF−1γ抗体
抗TiF−1γ抗体（インデックス値）
抗Mi−2抗体
抗Mi−2抗体（インデックス値）
抗ds−DNA抗体
抗ds−DNA抗体IgG（FEIA）
抗ミトコンドリアM2 抗体
抗RNP抗体（FEIA）
抗U−1−RNP抗体
その他自己抗体
遺伝子異常の有無
病理診断
NCNP筋病理所見
診断名（ICD−10準拠）
確立診断名
治療歴

【糸球体疾患】
性別
年齢
身長
体重
人種
病名（入院時）
併存症
既往症
家族歴（腎疾患・透析）
家族歴（腎疾患以外）
喫煙歴有無
飲酒歴有無
血圧（検体採取日）
ウイルス検査結果
HBs抗原
HCV抗体
HIV−1/2
HTLV−1/2
尿検査
P
OB
P/Cr
RBC
赤血球形態
尿中β2MG
尿中NAG
蓄尿蛋白量
NGAL
顆粒円柱
脂肪円柱
卵円形脂肪体
血液検査
Cr
eGFR
BUN
TP
Alb
T−chol
LDL−C
TG
CRP
IgG
IgA
IgM
C3
C4
CH50
ASO
リウマチ因子
抗核抗体
HbA1c
WBC
Hb
Ht
PLT
MPO− ANCA抗体
MPO− ANCA抗体価
PR3−ANCA抗体
PR3−ANCA抗体価
抗GBM抗体
抗GBM抗体価
IgE
好酸球比率
病理診断
採取部位
蛍光免疫染色
IgG
IgA
IgM
C3c
C1q
Fib
病名（ICD−10）
治療歴
ステロイドパルス療法の有無
IgA腎症の場合
両側口蓋扁桃摘出術の有無
ステロイドパルス療法の有無
治療終了後の検査結果
P
OB
P/Cr
RBC